FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

ABIR

NÚMERO DE REGISTRO

13.261 – Denominación común del producto NIMROD QUATTRO

COMPOSICIÓN

BUPIRIMATO 25% p/v (250 g/l)
Contiene N-butanol (CAS: 71-36-3); Disolvente nafta del petróleo (CAS: 64742-94-5); Keroseno (CAS: 64742-47-8)

FORMULACIÓN

Concentrado emulsionable (EC)

DESCRIPCIÓN

Fungicida sistémico para el control de oidio y oidiopsis.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA



PELIGRO

H226 Líquidos y vapores inflamables.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.
P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
P260 No respirar el gas, los vapores ni la nube de pulverización.
P331 NO provocar el vómito.
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN

Envases de 1L y 5L

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS, MODO DE EMPLEO Y PLAZOS DE SEGURIDAD

Cultivos	Enfermedades	Dosis	Modo de empleo	P.S.
Albaricoquero	oídio	0,03-0,06 %		15 días
Berenjena	oidiopsis	0,2-0,3 %	Tratar a la aparición de los síntomas de la enfermedad, pudiendo repetir a intervalos de 10-15 días, con un máximo de 3 l/ha por aplicación	3 días
Cucurbitáceas de piel comestible	oídio	1-1,5 l/ha	Aplicar diluido en el agua de riego	1 día
Cucurbitáceas de piel no comestible	oídio	1-1,5 l/ha	Aplicar diluido en el agua de riego. Tratar al aire libre con la dosis mínima y con la máxima en invernadero	1 día
Fresales	oídio	0,1 %	Tratar un máximo de 1 l/ha	3 días
Guisantes verdes	oídio	1-1,5 l/ha	Solamente los destinados para consumo en grano. Aplicar diluidos en 200-400 l de agua	15 días
Lúpulo	oídio	1-1,5 l/ha	Aplicar diluidos en 200-400 l de agua	15 días
Manzano	oídio	0,03-0,06 %		15 días
Melocotonero	oídio	0,03-0,06 %	Incluye diferentes variedades (nectarino, etc.), salvo casos de fitotoxicidad. Efectuar un máximo de 4 aplicaciones por campaña espaciadas 10-12 días, sin superar 1l/ha por aplicación	7 días
Ornamentales leñosas	oídio	0,3 %		NP
Pimiento	oidiopsis	0,2-0,3 %	Tratar un máximo de 3 l/ha	3 días
Remolacha azucarera	oídio	1-1,5 l/ha	Aplicar diluidos en 200-400 l de agua	15 días
Rosal	oídio	0,3 %		NP
Tabaco	oídio	1-1,5 %	Aplicar diluidos en 200-400 l de agua	15 días
Tomate	oidiopsis	0,2-0,3 %	Tratar a la aparición de los síntomas de la enfermedad, pudiendo repetir a intervalos de 10-15 días, con un máximo de 3 l/ha por aplicación	3 días
Vid	oídio	0,06-0,1 %		15

FICHA TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

ABIR se aplica en pulverización normal sobre los cultivos, hasta obtener una perfecta cubrición. Los tratamientos se iniciarán cuando se manifiesten los primeros ataques.

FITOTOXICIDAD

- Rosal: Debido a que es un cultivo muy delicado, y al gran número de variedades existentes, recomendamos hacer una pequeña prueba antes de generalizar las aplicaciones, tanto si se aplica sólo como si es en mezcla con otros productos, dejando pasar 16 días antes de continuar los tratamientos.
- Manzanos: Se puede producir una ligera defoliación en variedades Cox, Jonathan, Imperatore y Reineta.
- Restantes cultivos: No se ha producido fitotoxicidad en ninguno de los cultivos recomendados, utilizando las dosis señaladas. Cuando se han sobrepasado estas dosis, en algunos casos se han observado quemaduras en las hojas, seguidas de defoliación.

COMPATIBILIDAD

ABIR es compatible con los insecticidas y fungicidas que se recomiendan normalmente en los cultivos mencionados.

OBSERVACIONES

Una lluvia, algunas horas después de la aplicación, no influye en el tratamiento. Mojar abundantemente para que la cubrición sea perfecta.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.