Aminoácidos Plymag® SL

Bionutriente a base de aminoácidos de origen vegetal.

Contenido declarado

Aminoácidos libres 7,0 % p/p
Nitrógeno (N) total: 4,6 % p/p
Nitrógeno (N) orgánico 2,5 % p/p
Nitrógeno (N) amoniacal: 2,1 % p/p

INFORMACIÓN ADICIONAL

Materia orgánica (MO): 38,0 % p/p
Carbono orgánico (CO): 22,0 % p/p



**Proporción de aminoácidos libres respecto al total de aminoácidos*

Características físicoquímicas

ASPECTO	Liquido
COLOR	Marrón
pH (Directo)	5,7
DENSIDAD	1,15 kg/L



Características

Aminoácidos Plymag® SL es un bionutriente basado en aminoácidos obtenidos mediante fermentación enzimática a partir de un sustrato vegetal rico en proteínas. Se trata de un producto pensado para activar a las plantas en las fases críticas del cultivo.

Aminoácidos Plymag® SL es rico en materia orgánica, que junto a los aminoácidos y su complemento mineral permite a la planta:

- Un mejor desarrollo, incluso en condiciones limitantes (estrés, bajas temperaturas...)
- Mejorar el enraizamiento y su desarrollo vegetativo.
- Potenciar el desarrollo de frutos incrementando el rendimiento final.

PLYMAG
Pol. Ind. Sector 2 – C/Dénia nº126 (03780) Pego, Alicante. España
Tel. +34 965 570 992 - www.plymag.com|info@plymag.com

Forma de aplicación y dosis

Aminoácidos Plymag® SL está desarrollado especialmente para aplicación foliar, aunque también puede utilizarse vía fertirriego.

Recomendamos aplicar al inicio del enraizamiento y después realizar 2-3 aplicaciones durante el crecimiento vegetativo.

APLICACIÓN FOLIAR	
Dosis (ha/aplicación)	0.3-0.5%
Nº de aplicaciones por ciclo	1-2

En periodos de estrés aplicar vía radicular cada 8 días.

FERTIGATION	
Dosis (L/ha y ciclo)	20-40L/ha y ciclo
Nº de aplicaciones por ciclo	2-4
Concentración máxima recomendada (en tanque de aplicación)	10%

Aminoácidos Plymag® SL, uso en fresas en fertirrigación.
Realizar aplicaciones de 2-4 L/ha durante la fase de enraizamiento posteriormente se pueden realizar de 2-3 aplicaciones durante el crecimiento vegetativo a razón de 2-3 L/ha.
En periodos de estrés aplicar en fertiirrigación cada 8 días.

Indicaciones de uso

Aminoácidos Plymag® SL no tiene problemas en su aplicación, no obstante, en caso de duda, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y seguir siempre las recomendaciones básicas de aplicación en campo.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). PLYMAG, S.L. garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.