ANTIOIDIO ARTIC

FUNGICIDA DE CONTACTO SISTÉMICO Y TRANSLAMINAR CON ACTIVIDAD PREVENTIVA, CURATIVA Y ERRADICANTE		
COMPOSICIÓN *25% DIFENOCONAZOL*	**Registro Oficial** *18.767*	**FORMULACIÓN** *CONCENTRADO EMULSIONABLE*
		
ENFERMEDADES DIANA	FUNGICIDA DE AMPLIO ESPECTRO: OIDIO, MOTEADO, MONILIA, ALTERNARIA, SEPTORIA, CERCOSPORA, ABOLLADURA, CRIBADO, ROYA Y OTROS HONGOS	
MODO DE USO	PULVERIZACIÓN PREVIA DISOLUCIÓN EN AGUA	
EMBALAJE UD/CAJA	120 UD / 5 cc 36 UD / 20 cc	**USO AUTORIZADO** JARDINERÍA EXTERIOR DOMÉSTICA

CARACTERÍSTICAS

ANTIOIDIO ARTIC es un fungicida sistémico del grupo de los triazoles, de acción preventiva, curativa y erradicante. Protege el cultivo permanentemente, impidiendo el desarrollo de la enfermedad y deteniendo la infección durante el período de incubación (acción curativa).

El Difeconazol es absorbido rápidamente por las partes verdes de la planta, evitando quedar expuesto a la lluvia y/o riego (buena persistencia de acción y resistencia al lavado). Asegura una buena protección de los órganos tratados ejerciendo a lo largo del tiempo un control eficiente sobre la enfermedad.

El movimiento en el interior de las hojas y ápices vegetativos es esencialmente translaminar, y la translocación vía xilema o acrópeta (sistema ascendente). El

producto llega por lo tanto fácilmente hasta los tejidos más internos de la planta, favoreciendo el control de las infecciones que inciden tanto en el haz como el envés de las hojas.

Su modo de acción consiste en la inhibición de la biosíntesis del ergosterol, actuando principalmente sobre la desmetilación del C14 e impidiendo el crecimiento subcuticular del micelo. El Difeconazol actúa en el hongo patógeno durante la penetración y formación de haustorios, interfiriendo con la biosíntesis de las membranas celulares.

El efecto sobre los patógenos se realiza a todos los niveles: controla aquellos hongos que recién han iniciado su proceso de infección, disminuye la esporulación de los patógenos que ya están establecidos en la planta y también protege contra posibles infecciones futuras. Todo ello dota al producto de una tremenda flexibilidad respecto la época de aplicación para ejercer un control eficaz de las enfermedades fúngicas más habituales que afectan a los cultivos.

MODO DE EMPLEO

ANTIOIDIO ARTIC se presenta en una formulación de calidad (concentrado emulsionable) fácil de medir y cómoda de usar. Diluir el producto en agua y aplicarlo mediante un equipo de pulverización.

Los mejores tratamientos se obtienen aplicando **ANTIOIDIO ARTIC** de forma preventiva. Para prevenir un daño irreversible en el cultivo y el desarrollo de la enfermedad, se aconseja comenzar las aplicaciones previamente o a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.
Para una protección total del cultivo se recomienda realizar un total de 4 aplicaciones distanciadas 15 días durante un período de 2 meses.
En términos generales, dosificar a razón de:

VOLUMEN AGUA	DOSIS ANTIOIDIO ARTIC
5 L.	2 cc.
10 L.	3,5 cc.
15 L.	5 cc.

Verter la cantidad necesaria del producto en el equipo de pulverización, llenado con agua hasta la mitad, y completando posteriormente el volumen de agua necesario. Mezclar enérgicamente.

ANTIOIDIO ARTIC ofrece buena compatibilidad en mezclas y no provoca manchado en los frutos ni en las hortalizas de hoja. Es compatible con la gran mayoría de productos distribuidos por MASSÓ. En caso de mezcla se recomienda realizar un ensayo previo para observar la compatibilidad física y la reacción del cultivo en los días siguientes al ensayo.

APLICACIONES AUTORIZADAS

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Albaricoquero	ABOLLADURA	7	**Melocotonero**	OIDIO	7
Albaricoquero	CRIBADO	7	**Mora-frambueso**	ANTRACNOSIS	3
Albaricoquero	MONILIA	7	**Mora-frambueso**	OIDIO	3
Albaricoquero	OIDIO	7	**Mora-frambueso**	ROYA	3
Alcachofa	OIDIO	14	**Nectarino**	ABOLLADURA	7
Apio	SEPTORIA	14	**Nectarino**	CRIBADO	7
Brécol	ALTERNARIA	14	**Nectarino**	MONILIA	7
Caqui	MANCHA PURPURA	NP	**Nectarino**	OIDIO	7
Cardos comestibles	SEPTORIA	14	**Níspero**	MOTEADO	14
Cerezo	MONILIA	7	**Olivo**	REPILO	30
Chirivia	ALTERNARIA	14	**Patata**	ALTERNARIA	30
Ciruelo	MONILIA	7	**Pepino**	OIDIO	3
Ciruelo	OIDIO	7	**Peral**	MOTEADO	14
Clavel	ROYA	NP	**Peral**	ROYA	14
Dalia	OIDIO	NP	**Peral**	SEPTORIA	14
Espárrago	ALTERNARIA	NP	**Pimiento**	ALTERNARIA	7
Espárrago	ROYA	NP	**Pimiento**	OIDIOPSIS	7
Espárrago	STEMFILIUM	NP	**Puerro**	ALTERNARIA	21
Fresales	OIDIO	3	**Remolacha azucarera**	CERCOSPORA	21
Guisantes verdes	ANTRACNOSIS	7	**Remolacha azucarera**	OIDIO	21
Guisantes verdes	MICOSFAERELLA	7	**Repollo**	ALTERNARIA	14
Hinojo	RAMULARIA	3	**Rosal**	OIDIO	NP
Judías verdes	ANTRACNOSIS	7	**Rosal**	ROYA	NP
Judías verdes	MICOSFAERELLA	7	**Tomate**	ALTERNARIA	7
Lechugas y similares	ALTERNARIA	14	**Tomate**	CLADOSPORIOSIS	7
Manzano	MOTEADO	14	**Tomate**	OIDIOPSIS	7
Melocotonero	ABOLLADURA	7	**Vid**	BLACK-ROT	21
Melocotonero	CRIBADO	7	**Vid**	OIDIO	21
Melocotonero	MONILIA	7	**Zanahoria**	ALTERNARIA	14