FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

BLANCADO® 47,5 SC

NÚMERO DE REGISTRO

23.943

COMPOSICIÓN

Captan 47,5% p/p (475 g/l).

FORMULACIÓN

Suspensión concentrada (SC)

DESCRIPCIÓN

Fungicida de amplio espectro.

Fungicida con una nueva formulación líquida en forma de suspensión concentrada, con la que se consigue una mayor seguridad y comodidad en la preparación de los tratamientos.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÒGICA



ATENCIÓN

H332 Nocivo en caso de inhalación
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H351 Se sospecha que provoca cáncer.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P261 Evitar respirar los vapores.
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P309+P311 EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: llamar a un CENTRO de información toxicológica o a un médico.
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P391 Recoger el vertido.
P501 Eliminar el contenido y/o el recipiente de conformidad con la normativa sobre
residuos peligrosos.
EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN

Envases de 5 l.

APLICACIONES AUTORIZADAS

Tratamientos fungicidas preventivos en cultivos de:
-Albaricoquero, cerezo, melocotonero , nectarino: Abolladura, antracnosis, chancro, cicatrización de heridas por granizo, cribado, monilia y moteado.
- Ciruelo: Abolladura, antracnosis, chancro, cicatrización de heridas por granizo, monilia y moteado.
- Frutales de pepita: Antracnosis, chancro, cicatrización de heridas por granizo, monilia y moteado.
- Fresales (sólo en cultivos al aire libre): Antracnosis, botritis y mildiu.
- Tomate (sólo en cultivos al aire libre): Alternaria, actracnosis, botritis y mildiu.
- Arbustos ornamentales y ornamentales herbáceas (sólo en cultivos al aire libre): Botritis, fialofora, fusarium, mildiu, rizoctonia y roya.
- Rosal (sólo en cultivos al aire libre): Antracnosis.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal mediante tractor, sólo en cultivos al aire libre, con un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha.
- **Albaricoquero, cerezo, melocotonero y nectarino:** Aplicar a una dosis de 250-300 cc/hl y para cicatrización de heridas de granizo, emplear una dosis de 300-400 cc/hl. Efectuar una aplicación por ciclo de cultivo, sin sobrepasar los 2,1 l de producto/ha.
- Ciruelo: Emplear a una dosis de 250-300 cc/hl y para cicatrización de heridas por granizo, aplicar a una dosis de 300-400 cc/hl. Efectuar una aplicación por ciclo de cultivo, sin sobrepasar los 2,1 litros de producto/ha.
- Frutales de pepita: Dosificar a razón de 250-300 cc/hl y para cicatrización de heridas por granizo emplear una dosis de 300-400 cc/hl. Efectuar una aplicación por ciclo de cultivo, sin sobrepasar los 2,1 litros de producto/ha.
- Fresales: Aplicar a una dosis de 250-300 cc/hl. Efectuar hasta dos aplicaciones por ciclo de cultivo, espaciadas 7 días, sin sobrepasar los 3,0 litros de producto/ha.
- Tomate: Dosificar a razón de 250-300 cc/hl. Efectuar hasta 3 aplicaciones por ciclo de cultivo, a intervalos de 7 días, sin sobrepasar los 3,8 litros de producto/ha.
- Arbustos ornamentales y ornamentales herbáceas: Emplear una dosis de 250-300 cc/hl. Efectuar una aplicación por ciclo de cultivo, sin sobrepasar los 4,5 litros de producto/ha.
- Rosal: Aplicar a una dosis de 250-300 cc/hl. Efectuar una aplicación por ciclo de cultivo, sin sobrepasar los 4,5 litros de producto/ha.

PLAZO DE SEGURIDAD

Fresales: 14 días.
Albaricoquero, cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y tomate: 21 días.
Frutales de pepita: 28 días.
Arbustos ornamentales, ornamentales herbáceas y rosal: No procede.

FICHA TÉCNICA

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente