# CALIBITT®

## EL **CALCIO** DE LA ALTA EFICIENCIA

### CORRECTOR DE CALCIO PARA APLICACIÓN FOLIAR EN VARIOS CULTIVOS

FORMULACIÓN ESPECIALMENTE ESTUDIADA PARA UNA ÓPTIMA ABSORCIÓN POR VÍA FORLIAR



**DENOMINACIÓN:**

**FORMIATO CÁLCICO con BORO (B)** ABONO DE MEZCLA

**RIQUEZAS GARANTIZADAS:**

| | |
|---|---|
| CaO soluble en agua | 33,6% p/p |
| Formiato | 56% p/p |
| Boro (B) soluble en agua | 0,9% p/p |

**PRECAUCIONES**



**PELIGRO**

H318 Provoca lesiones oculares graves.
P102 Manténgase fuera del alcance de los niños.
P103 Lea la etiqueta antes de usar.
P261Evitar respirar el polvo.
P262 Evítese el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas y máscara de protección.
P270 No comer, beber ni fumar mientras se manipula este producto.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL : Lavar con agua y jabón abundantes.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P401 Almacenar lejos de alimentos, bebidas y piensos.

**ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN**

Conservar el producto en su envase original cerrado, en un lugar seco y al abrigo de temperaturas extremas.
Manipular con guantes y careta homologada.

ESTE ENVASE, UNA VEZ VACÍO DESPUÉS DE UTILIZAR SU CONTENIDO, ES UN RESIDUO PELIGROSO POR LO QUE EL USUARI ESTA OBLIGADO A ENTREGARLO EN LOS PUNTOS DE RECEPCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIGFITO.

**LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

**RECOMENDACIONES DE USO**

| CULTIVO | MOMENTO DE APLICACIÓN |
|---|---|
| MANZANO | Desde floración, tratar cada 10-15 días (3-4 tratamientos).<br>Bitter pit: Tratar los meses de (julio-agosto) precedentes a la cosecha. |
| CEREZO, PARAGUAYO, MELOCOTONERO Y NECTARINO | Para prevenir el rajado, mejorar la consistencia del fruto y la mejor calidad de conservación en postcosecha.<br>Aplicar durante el crecimiento del fruto hasta antes de la cosecha. |
| CÍTRICOS | Durante el verano para evitar el rajado, picado y separación de la corteza.<br>Aplicar desde junio hasta antes de la cosecha. |
| UVA DE MESA Y DE VINIFICACIÓN | Aplicar al cierre del racimo y a inicio del envero. |
| TOMATE Y PIMIENTO | Para prevenir la "peseta" (Fruit rot), dar firmeza y calidad.<br>Aplicar desde la formación del os ramilletes. |
| LECHUGA, COL, CUCURBITÁCEAS | Para prevenir el Tip burn (necrosis foliar) y mejorar la conservación.<br>Aplicar después del transplante o inicio de floración. |
| OTROS FRUTOS, PLATANERA KIWI, TROPICALES, etc. | En general mejora la firmeza, la calidad y la conservación. |
| FRESA Y OTRAS BERRIES | Mejora la firmeza, el aspecto y la conservación (postcosecha). |

***La dosis general de aplicación es de 0,25-0,5% (250-500 g/hl), en pulverización foliar.***

**ADVERTENCIAS Y COMPATIBILIDADES EN TANK MIX**

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.) La Compañia garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc), por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

**Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios, tanto en lo relativo a la mezcla física en el tanque o en relación al efecto biológico en el cultivo.**


MASSÓ AGRO DEPARTMENT

Fabricado por:
**COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.**
Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona, ESPAÑA
Tel. +34 93 495 25 00 - Fax +34 93 495 25 02
E-mail: masso@cqm.es - www.massoagro.com


Lote y fecha de fabricación:
*Ver marcado impreso*

**Contenido neto:**
**5 kg**

MAM-03/15
V.1

www.massoagro.com