

Feromona
Ceratitis capitata

FICHA TÉCNICA | **PHEROcontrol *Ceratitis capitata***

NOMBRE: Feromona para *Ceratitis capitata* (Mosca mediterránea de la fruta).

INGREDIENTES ACTIVOS:

- Trimedlure.

FORMATO:

Difusor que contiene químicos activos y conservantes, envasado en bolsa metalizada, hermética. Contiene 2 g de trimedlure. Preguntar por otros formatos.



Producto

FUNCIÓN: monitoreo.

Las feromonas son sustancias químicas que fabrican y dispersan los insectos en el aire, y a su vez, son captadas por otros insectos de la misma especie. Las de confusión sexual son las más utilizadas para la detección, seguimiento y control biológico de las plagas.

MODO DE ACCIÓN: Para-feromona de atracción sexual.

- Para-feromona de atracción sexual, fabricada con un compuesto sintético que provoca la misma reacción que las feromonas naturales.
- Cuando el difusor es colocado en la trampa, la feromona se va liberando lentamente para atraer y capturar al macho, evitando así el apareamiento y, por tanto, la reproducción.

CULTIVOS RECOMENDADOS:

Se puede utilizar en diversos cultivos, entre los que se incluyen diversos cítricos, frutales y viña.

MANEJO:

- Extraer el difusor del envase en el momento del uso.
- Colocarlo en el centro de la trampa DELTA o en la canastilla en el caso de su uso con mosquero. No colocar varios difusores en la misma trampa.
- Retirar el envoltorio en una zona alejada del área de monitoreo.
- Introducir antes de que emerja la primera generación y hasta el final de campaña.

TRAMPA:

- Preferiblemente utilizar con TRAPcontrol-DELTA. También compatible con Mosqueros.
- Colocar la trampa en el lado sombreado del árbol, a 1,5 m de altura. Evite bloquear las entradas de la trampa con follaje vegetal



TRAPcontrol - DELTA

- Revisar las trampas 1 o 2 veces por semana. Recoger datos semanalmente, prestando mayor atención en época de mayor población. Las decisiones sobre aplicación de tratamientos no se basarán únicamente en la interpretación de los datos sobre las también deberán tenerse en cuenta consideraciones climáticas y biológicas.
- Para obtener resultados óptimos, reemplace el difusor cada 4 semanas, reemplazando el adhesivo o vaciando el depósito, según corresponda, cuando esté lleno de insectos o polvo.

DENSIDAD:

- Colocar 2 o 3 trampas por hectárea en áreas grandes y uniformes de cultivos o entre 3 y 5 trampas por hectárea en áreas de cultivos menos densas y mixtas.

DURACIÓN:

De 8 a 11 semanas. Dependiendo de la temperatura, aireación y humedad ambiental, este periodo puede extenderse o verse afectado. Reemplazar pasado este periodo o seguir las recomendaciones de las autoridades agrarias. Retire el dispensador viejo en una zona alejada del área de monitoreo.

CONSEJOS DE MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN:

- No tocar con las manos el difusor donde va impregnado el atrayente. Es aconsejable lavarse las manos antes de manipular el difusor para evitar intervención de olores, e inmediatamente después de su uso. Se recomienda el uso de guantes descartables durante su manipulación.
- Evitar el contacto directo prolongado.
- En caso de irritación, consulte a su médico.
- Conservar el envase en congelador hasta 24 meses. En refrigeración, de 4 a 10ºC, no almacenar más de 18 meses. Conservar en su envase original. No romper la cadena de frio en el proceso de transporte y almacenamiento. Mantener alejado de la luz solar directa, el calor, las chispas o las llamas.

Pregúntenos sobre otros formatos disponibles. Compruebe con las autoridades locales que productos están autorizados para su uso. Este documento es solo informativo. Agrobío no es responsable de un uso indebido del productoD