FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

CHORUS

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Fungicida sistémico con acción preventiva y curativa durante el periodo de incubación de los hongos, resistente al lavado una vez secado el caldo de la pulverización y cuya eficacia no es afectada por bajas temperaturas. Es un producto indicado para el control de Monilia en frutales de hueso y moteado en frutales de pepita.

COMPOSICIÓN

50% p/p de Ciprodinil

Nº DE REGISTRO

24.443

FORMULACIÓN

Granulado dispersable en agua (WG)

PRESENTACIÓN

Formato	Uds. / embalaje	Palet kg/L
1 kg	10	270 kg

MODO DE ACCIÓN

CHORUS es un fungicida que inhibe la síntesis de la metionina, aminoácido esencial del hongo que interfiere sobre los procesos de transporte de la membrana plasmática y bloquea la producción de los enzimas hidrolíticos del hongo necesarios para la penetración de las hifas dentro de los tejidos de la planta . Actúa en el ciclo de vida de los hongos principalmente durante el proceso de penetración y el crecimiento del micelio dentro del tejido de la planta. Muestra una buena y rápida translocación acrópeta (sistema ascendente) dentro de las hojas y frutos.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivos	Enfermedad	Dosis	Nº Max. Aplicaciones
Albaricoquero	Monilia	0,3-0,75 Kg/ha	2
Cerezo	Monilia	0,3-0,75 Kg/ha	2
Ciruelo	Monilia	0,3-0,75 Kg/ha	2
Manzano	Moteado	0,3-0,75 Kg/ha	2
Melocotonero	Monilia	0,3-0,75 Kg/ha	2

Cultivos	Enfermedad	Dosis	Nº Max. Aplicaciones
Nectarino	Monilia	0,3-0,75 Kg/ha	2
Peral	Moteado	0,3-0,75 Kg/ha	2

Aplicar en pulverización foliar, comenzando los tratamientos cuando se den las condiciones para el desarrollo de la enfermedad desde la apertura de las yemas hasta la madurez del fruto en frutales de hueso y desde el estadio oreja de ratón hasta el cuajado en frutales de pepita. Aplicar un volumen de caldo adecuado a la vegetación, con un máximo de 1500 l/ha, sin sobrepasar el punto de goteo.

Norma general para todos los cultivos: En las areas de fuerte riesgo del patógeno, utilizar las dosis superiores y/o los intervalos más cortos. Si en función de la climatología y del desarrollo de la enfermedad fuese necesaria la realización de más aplicaciones, éstas se harán con productos fungicidas de diferente modo de acción

PLAZO DE SEGURIDAD y LMRs

CULTIVO	PLAZO DE SEGURIDAD	LMR Ciprodinil
Albaricoquero	7 días	2 mg/kg
Ciruelo	7días	2 mg/kg
Cerezo	7 días	2 mg/kg
Manzano	21 días	2 mg/kg
Melocotonero	7 días	2 mg/kg
Nectarino	7 días	2 mg/kg
Peral	21 días	2 mg/kg

"Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes a la fecha de revisión indicada en el documento. Para información actualizada consultar la página oficial de la UE: EU-pesticides-database"

PREPARACIÓN DEL CALDO

Llenar el tanque del pulverizador con agua hasta un tercio de su capacidad. Poner en marcha el agitador. Quitar el filtro de la boca de carga y verter el producto directamente en el tanque, con el agitador en funcionamiento. Completar el volumen de agua necesario, y esperar a que el producto esté completamente dispersado antes de iniciar la aplicación, mantener el agitador en marcha durante la pulverización.

RIESGOS TOXICOLÓGICOS Y AMBIENTALES



- **Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.**
- **Contiene ciprodinil. Puede provocar una reacción alérgica.**
- **Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.**
- Evitar respirar la niebla.
- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Recoger el vertido.

PRIMEROS AUXILIOS

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel lave con abundante agua y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y, lleve la etiqueta o el envase.

FRASES DE RIESGO RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

AVES Y MAMÍFEROS	-
ORGANISMOS ACUATICOS	Para proteger a los organismos acuáticos respétese sin tratar una banda de seguridad de 50 m en manzano y peral en estadíos tempranos (BBCH<40) y 20 m para manzano y peral, en estadíos tardíos (BBCH>40), y para el resto de cultivos, hasta las masas de agua superficial.
ABEJAS	-
ARTRÓPODOS	Para proteger a los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada.
LOMBRICES	-

PRECAUCIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DEL OPERADOR/TRABAJADOR

Aplicador

Para la aplicación y limpieza y mantenimiento del equipo, deberán utilizarse guantes de protección química, ropa de protección química tipo 3 o 4 (de acuerdo a la UNE-EN 1405:2005+A1:2009), y calzado adecuado. Para la mezcla/carga deben utilizarse guantes de protección química.

Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanillas cerradas.

No entrar en el cultivo hasta que el producto esté seco.

Trabajador

Para la re-rentrada en la parcela tratada, deben utilizarse guantes de protección química para las tareas de más de 2 horas de duración. No tratar con este producto en aquellas labores que impliquen actividades mecánicas que puedan derivar en un deterioro de los guantes de protección química del trabajador durante la re-entrada de éste a la parcela.

Lávese toda la ropa después de usarla.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Syngenta España, S.A.
C/ Ribera del Loira, 8 – 10 3ª planta
28042 – Madrid
Telf.: 91 387 64 10
www.syngenta.es