Drupal.behaviors.print = function(context) {$(window).load(function() {window.print();})};>

Fast Fruit Max



REFERENCIA: 10041113

Producto hormonal que se utiliza como fitorregulador a base de la materia activa 2,4-D.

Se trata de una auxina sintética que, aplicada en cítricos en los momentos previos a la maduración del fruto, inhibe la formación de la zona de abscisión del pedúnculo por competencia hormonal auxina-etileno, por lo que se reduce la caída de frutos

Presentación: 200 cc
Composición: Ácido 2,4-D (sal dimetilamina) 10% p/v
Formulación: Líquido soluble [SL]
Nº de Registro: ES-00107
Clasificación: --
Riesgos para el medio ambiente: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

CULTIVO	TRATAMIENTO	DOSIS	PS
Naranjo	Evitar caída fruto	15-22,5 mL/hL (120-270 mL/ha)	30

Recomendaciones:

Aplicar al aire libre en el momento que el fruto empieza a colorear (cambio de color), no antes del cambio de color de los frutos. Los tratamientos no deben efectuarse en plantaciones jóvenes, ni cuando existan brotes tiernos. Normalmente las aplicaciones se hacen a partir de octubre-noviembre, dependiendo de la variedad y fecha prevista de recolección.

Efectuar una aplicación por campaña

Compatibilidad:

Se consideran cultivos sensibles (que pueden ser dañados por productos hormonales): Algodonero, crucíferas, leguminosas, frutales de hueso y pepita, olivo, girasol, lechuga, remolacha, tomate, vid, pepino, tabaco, estramonio, cultivo de flores ornamentales y arbustos florales.