


# FUNGICIDA SISTÉMICO MASSÓ

## POLVO MOJABLE (WP)

FUNGICIDA SISTÉMICO CON EFECTO PREVENTIVO Y CURATIVO

FUNGICIDA CONTRA LA PHYTOPHTHORA, GOMOSIS, AGUADO Y PODREDUMBRE.

**COMPOSICIÓN:** FOSETIL-AL 80%

### 1 FUNGICIDA SISTÉMICO

SE CARACTERIZA POR UNA SISTEMIA COMPLETA ASCENDENTE Y DESCENDENTE.

### 2 TRATAMIENTO PREVENTIO Y CURATIVO

ASEGURA UNA PROTECCIÓN PREVENTIVA DE LARGA DURACIÓN, ASÍ COMO ACCIÓN CURATIVA DURANTE LOS 2-3 DÍAS SIGUIENTES A LA INFECCIÓN.

### 3 DOS MÉTODOS DE ACCIÓN

BLOQUEA LA ESPORULACIÓN DEL HONGO Y ESTIMULA LAS DEFENSAS NATURALES DE LA PLANTA.

### 4 AUTORIZADO PARA JARDINERÍA EXTERIOR DOMÉSTICA

POLVO MOJABLE **PARA DILUIR**

USO MEDIANTE **PULVERIZACIÓN**

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO LÉASE DETENIDAMENTE
LA ETIQUETA Y SÍGANSE LAS INSTRUCCIONES PROPUESTAS

## DESCRIPCIÓN

FUNGICIDA SITÉMICO MASSÓ es un fungicida sistémico formulado en base a Fosetil-Al, con efecto preventivo-curativo para el control de phytophthora (podredumbre del cuello de la raíz, gomosis del tronco y aguado de frutos).

## COMPOSICIÓN

80% Fosetil-Al

## MODO DE ACCIÓN

El Fosetil-Al tiene capacidad de traslocación tanto a través el xilema (ascendente) como por el floema (descendente). Penetra en menos de una hora en la planta y de trasloca siguiendo la corriente de la savia. Ejerce su acción por dos vías:

- Vía directa: por bloqueo de la esporulación del hongo, que impide la formación de esporangios, esporocistos, oosporas y clamidiosporas.
- Vía indirecta: por estimulación de las defensas naturales de la planta que hace intervenir mecanismos fisiológicos complejos y múltiples.

El Fosetil-Al afecta los sistemas de transporte y penetración en la pared del hongo, así como el metabolismo energético, disminuyendo la respiración y la producción de ATP. La existencia de distintas afectaciones bioquímicas que actúan a diferentes niveles se traduce en una acción multisitio en el interior del citoplasma de las células afectadas, lo que imposibilita o dificulta la aparición de resistencias.

## MODO DE EMPLEO Y DOSIS

FUNGICIDA SITÉMICO MASSÓ se aplica en pulverización por vía foliar a razón de:

| VOLUMEN AGUA | DOSIS FUNGICIDA SITÉMICO MASSÓ |
|---|---|
| 5 L. | 15 gr. |
| 10 L. | 30 gr. |
| 15 L. | 45 gr. |

Mediante riego entre aparición de los primeros pétalos y la maduración de los frutos a dosis de 5 – 25 g por árbol, con dos aplicaciones por campaña.

Para conseguir una actuación eficaz del producto deben efectuarse las aplicaciones durante el período de crecimiento de la planta.

FUNGICIDA SITÉMICO MASSÓ no debe ser mezclado en tratamientos con productos a base de cobre, con aceites, con fertilizantes foliares nitrogenados ni mojantes.

| USO | AGENTE | CONDIC. ESPECIFICO | P.S. (DÍAS) |
|---|---|---|---|
| Cítricos | Aguado, gomosis de los cítricos, Phytophthora y mildiu terrestre del tomate. | Realizar un máximo de 3 tratamientos durante los meses de abril, julio y octubre/noviembre (intervalo de 90-120 días). | 15 |
| Frutales de pepita | Phytophthora | Realizar un máximo de 3 tratamientos durante los meses de abril, julio y septiembre/octubre (intervalo de 90-120 días). | 15 |
| Vid | Mildiu de la vid y Plasomopara viticola | Realizar un máximo de 4 tratamientos, el primero antes de la floración y posteriormente otros 3 espaciados entre 10-14 días. | 28 |

## PRESENTACIONES

**Sobre de 45 g (120 Ud/caja)**

**Estuche de 500 g (20 Ud/caja)**

| | |
|---|---|
| **FORMA** | SÓLIDO (POLVO) |
| **COLOR** | BLANCO |
| **OLOR** | CARACTERÍSTICO |
| **PH** | 3-4 (1%) |
| **DENSIDAD** | 0,65 g/ml (20°C) |

**FR:** 2024/07/15

**COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.**
VILADOMAT, 321, 5º - 08029 BARCELONA (ESPAÑA)

MASSÓ

Walking together