NOMBRE: HUMISZEL

PRODUCTO / DENOMINACIÓN TIPO: ACIDOS HUMICOS

CONTENIDOS DECLARADOS:	**% p/p**	**%p/v**
Extracto húmico total	15.0	16.5
Ácidos húmicos	12.0	13.2
Ácidos fúlvicos	3.0	3.3
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua	5.0	5.5

CARACTERISTICAS:

Líquido de color oscuro

Densidad (a 20º C): 1,1 g/cc

pH: 13

USOS-DOSIS DE APLICACIÓN: **USOS:** Enmienda orgánica

DOSIS RECOMENDADA:

APLICACIÓN	DOSIS
Estimulante y potenciador de la germinación de las semillas:	En baño a concentraciones de 0,25-1 L/kg de semilla.
Como aditivo de abonos foliares o solubles:	De 25-50 cc/Hl de agua junto a la dosis de abono recomendada.
Como estimulante del enraizamiento durante el trasplante:	Diluir 0,2-0,3 L en 50 L de agua y sumergir en dicho baño las raíces o plantones de las plantas a trasplantar.
Como ayuda a una mejor asimilación de los fertilizantes una vez enraizada la planta:	Incorporar al agua de riego ya sea por sistema a pie o por goteo una dosis de 6-8 L/ha.
Como activador de la fertilidad natural del suelo:	Aplicar al suelo de 40-65 L/ha con la cantidad de agua de riego suficiente para su correcta penetración, fraccionando la dosis en 2 o 3 veces como mínimo: enraizado, cuajado y engorde del fruto).
Como potenciador del efecto quelante:	De 0,5-1 L/ha junto con la dosis normal de quelato a emplear.
Como potenciador del efecto de los caldos herbicidas:	De 0,3-0,6 L/ha junto con la dosis normal de herbicidas.

Aplicación en riego por goteo:
Cultivos hortícolas.

A partir del 2° riego después del trasplante, fraccionar en el riego por goteo la dosis oportuna en una o dos veces por semana y repetir a lo largo del ciclo vegetativo activo del cultivo a fertilizar. El fraccionamiento total de las dosis de 15% se realizará como mínimo en las tres fases más importantes de desarrollo del cultivo: enraizado - cuajado - engorde del fruto.
Dosis total del ciclo: 40-65 l/Ha.

Delegación Valencia
C/ Rio Gorgos, 6, Ctra. N-III Km.343 · 46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel: 961 920 589 · Fax: 961 920 365

Cultivos arbóreos: (marco de plantación 7m x 7m).

Incorporar cada 2-3 semanas durante el riego por goteo la dosis oportuna prevista a lo largo de su período activo de vegetación. El fraccionamiento total de las dosis de 15% se realizará como mínimo en las 3 fases principales del ciclo vegetativo anual del árbol. Principio de primavera - cuajado - engorde del fruto.
Dosis (por pie) total durante el ciclo: 200-325 ml.

ALMACENAMIENTO: Almacenar a una temperatura entre 5 y 35 ºC.

ENVASES: 20 L, 1000 L

AGRIMOR garantiza los contenidos y formulación indicados en la ficha técnica y en etiqueta pero no mezclas o manipulaciones que se realicen con el producto. En caso de mezclas o combinaciones con otros productos hacer pruebas de compatibilidad previas

Delegación Valencia
C/ Rio Gorgos, 6, Ctra. N-III Km.343 · 46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel: 961 920 589 · Fax: 961 920 365