Fecha: 08/12/2025
Versión: 1

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

INCREMENTUM® BLOOM

DESCRIPCIÓN

Mejorador de floración y cuaje de extracción en frío de algas marinas *ascophyllum nodosum* reforzado con fosforo, boro y molibdeno para aplicación foliar y fertirrigación.

COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN

Fertilizante RD506/2013 - grupo 4.1.07b: abono líquido con extracto de algas para aplicación foliar y fertirrigación.

Contenido declarado	**p/p**	**p/v**
• Manitol	0,7%	0,77%
• Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua	5,0%	5,50%
• Óxido de potasio (K2O) soluble en agua	3,5%	3,85%
• • Boro (B) soluble en agua	3,0%	3,3%
• • Molibdeno (Mo) soluble en agua	2,5%	2,75%
• pH: 4,2		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INCREMENTUM® BLOOM es una solución líquida diseñada que incrementa la floración y el cuaje de frutos de los cultivos. Su formulación concentra un aportes de fósforo para mayor número de flores, de boro para mayor viabilidad de polen, y de molibdeno para mayor cuaje de frutos reforzados con un extracto en frío de algas marinas *Ascophyllum nodosum*. Este último actúa como activador del metabolismo vegetal y carrier de los elementos minerales para garantizar su absorción y metabolización por los cultivos.

PRESENTACIÓN

Garrafas de 5L (caja de 4X5L)

MODO DE ACCIÓN

El uso de INCREMENTUM® BLOOM permite generar un mayor número de flores con más polen viable para cuajar más frutos y, consecuentemente, obtener un aumento significativo de la cantidad y calidad de cosecha.

USOS AUTORIZADOS

Cultivo	Dosis foliar	Dosis fertirrigación	Número de aplicaciones	Intervalo entre aplicaciones
Hortícolas de invernadero	1,5 - 2,5 L/ha	3 - 4 L/ha	2 - 4	7-10 días.
Hortícolas de aire libre	1,5 - 2 L/ha	2 - 3 L/ha	1 - 3	7-10 días.
Olivo y viña	1 - 1,5 L/ha	2 - 3 L/ha	1 - 2	10-15 días.
Cítricos	1,5 - 2 L/1000L	3 - 4 L/ha	1 - 2	15 días.
Frutales de hueso, de pepita y de cascara	1,5 - 2 L/ha	3 - 4 L/ha	1 - 2	15 días.
Frutales tropicales y subtropicales	1,5 - 2 L/ha	3 - 4 L/ha	1 - 2	15 días.
Tubérculos (patata…)	1 - 1,5 L/ha	2 - 3 L/ha	1 - 2	10-15 días.
Uva de mesa	1,5 - 2 L/ha	3 - 4 L/ha	1 - 2	15 días.
Fresa, fresón, frambuesa y arándano	1,5 - 2,5 L/ha	3 - 4 L/ha	2 - 4	7-10 días.

MODO DE EMPLEO

INCREMENTUM® BLOOM puede ser incorporado junto con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios usados habitualmente en agricultura. No mezclar con productos de reacción fuertemente alcalina o ácida.

ADVERTENCIAS

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Gestión de envases:



Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo que el usuario está obligado a entregar en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Otras indicaciones:

Clasificación CLP: Este producto no está clasificado de acuerdo al Reglamento (CE) N°1272/2008 (CLP).

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P270 No comer, beber o fumar durante su utilización.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco y seco, entre 5 y 35ºC.
Proteger de la luz solar y de las heladas.