Lecix



Producto a base de Lecitina de Soja
SUSTANCIA BÁSICA

Composición

Lecitina de Soja
SUSTANCIA BÁSICA
Concentrado emulsionable (EC)

COMPATIBILIDADES

Compatible con los productos habitualmente empleados en pulverización foliar.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA

Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización
P301+P312: En CASO DE INGESTION: Llamar CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
P330: Enjuagarse la boca
P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre resíduos peligrosos o envases y resíduos de envases respectivamente.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medioambiente, siga las instrucciones de uso.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manténgase almacenado en lugar fresco y seco. Con el fin de evitar accidentes, aplique las medidas de precaución habituales en la manipulación y almacenamiento de productos fertilizantes.

CLASIFICACIÓN ADR

No clasificado como mercancía peligrosa.

LEGISLACIÓN APLICABLE

Sustancia básica.
Producto comercializado de acuerdo con los requerimientos del reglamento 1116/2015 (SANCO / 12798 / 2014) aprobado el 1 de Julio de 2015

Características/Propiedades

Lecix aumenta la firmeza, mejora la consistencia y elasticidad, el brillo y el color de frutas y hortalizas. Reduce ciertas fisiopatías en frutos, ayuda a cicatrizar pequeñas heridas y tiene efecto estimulante del vigor del cultivo.

Lecix es un producto desarrollado para estimular las defensas naturales de las plantas. Su composición a base de lecitina de soja de origen natural, lo convierten en un producto ideal para este fin. La aplicación de **Lecix** a las dosis recomendadas no tiene efectos fitotóxicos sobre el vegetal.

Dadas las características fisico-químicas del producto, **Lecix** aporta un efecto coayudante en los tratamientos en los caldos fungicidas, herbicidas e insecticidas. Limita la deriva y el escurrimiento, mejora la compatibilidad y estabilidad de los caldos, aumenta la superficie de contacto y acelera la penetración de los fitosanitarios.

Dosis y modo de empleo

Lecix puede ser aplicado durante todo el ciclo.
Para conseguir un apropiado cubrimiento de la planta se recomienda pulverizar abundantemente sobre el haz y el envés de las hojas.

Dosis: 2,5 cc/L.

Cultivo	Enfermedad	Cultivo	Enfermedad
Frutales pepita	*P. leucotricha* (oídio).	Ornamentales	Todo tipo de hongos patógenos.
Frutales hueso	*T. deformans* (lepra).	Viña	*P. vitícola* (mildiu), *E. necátor* (oídio).
Lechuga	*E. cichoracearum* (oídio).	Grosella	*M. grossulariae* (oídio).
Hortalizas de fruto	*P. xhantii* (oídio).	Frambuesa	*S. macularis* (oídio), *P. americanum* (roya).
Tomate y patata	*P. infestans* (mildiu).	Fresa	*P. aphanis* (oídio), *P. fragariae* (mildiu).
Endivia	*A. cichorii* (alternaria).	Zanahoria	*L. taurica* (oídio).

ADVERTENCIA

Las características técnicas presentadas en este informe tienen carácter informativo y pueden ser susceptibles de variación sin previo aviso.

RESIDUOCERO PRODUCTO ECOLÓGICO

MORERA BIOCHEM

JOSÉ MORERA S.L.U. pol. 14, parc. 627, Ptda La Venta
46370 CHIVA (VALENCIA) - ESPAÑA
T: +34 963915944
www.morera.com
mail@morera.com

REV ES 0225