

Niredis®

Es un formulado a base de **azufre** con una **concentración del 80%**, en forma de gránulos dispersable en agua (WG), indicado como tratamiento fungicida y acaricida para aplicación en numerosos cultivos

Características

- **Niredis®** presenta una formulación exclusiva que lo dota de unas altas prestaciones para su almacenamiento y una capacidad de soportar elevadas concentraciones en agua, tanto sólo como en combinación con otros productos fitosanitarios.
- El reducido tamaño de partícula del azufre favorece un alto cubrimiento de la parte vegetal, aportando una mayor prevención de incidencia de oídio; el formulado presenta una excelente mojabilidad y dispersabilidad en agua.

Modo de empleo

1. Utilizar aplicado en pulverización foliar en agua, tomando las precauciones adecuadas para prevenir riesgos a las personas y al medioambiente.
2. Compatible con la gran mayoría de los productos fitosanitarios del mercado, en caso de duda realizar un prueba a pequeña escala.
3. Evitar el tratamiento con aceites 21 días antes y 21 días después de la aplicación del producto.
4. No aplicar foliarmente con temperaturas superiores a 30º C.

Presentación

Envases de 10 Kg y 25 Kg.

Niredis®

syngenta®

® 2024 Syngenta. Todos los derechos reservados. ™ y ® son marcas comerciales del Grupo Syngenta.
Use los productos fitosanitarios de manera segura.
Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Cultivos y dosis de registro

Uso	Agente	Dosis % (Kg/ha)	Nº máx. aplicac.	Intervalo (días)	Vol. caldo (l/ha)	Momento de aplicación
Aguacate, caqui, chirimoyo, granado, kiwi, platanera y otras plantaciones tropicales y subtropicales (excl. carambolas, chumberas, y guanábano)	Araña roja, Ácaros Eriofidos Oidio	0,2-0,5 (1,4-5 Kg/ha)	6	7-10	700-1000	Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad
Arándano (excl.. arándano común y arándano rojo y mirtilo)	Oidio, *Microsphaera penicillata*	0,2-0,5 (1-4 Kg/ha)	3	7-10	500-1000	Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad
Berenjena, pimiento y tomate (aire libre e invernadero)	Ácaros, Araña roja Oídio del tomate y oidiopsis	0,2 (0,8-2 Kg/ha)	6	Min. 10	400-1000	Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad
Frambueso, Zarzamoras	Oidio de la fresa	0,2-0,5 (1-4 Kg/ha)	3	7-10	500-1000	Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad
Fresal ornamentales (aire libre e invernadero)	Oidio de la fresa	0,2-4 (1-4 Kg/ha)	6	7-10	500-1000	Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad
Frutales de hueso (melocotón, nectarina, cerezo y ciruelo)	Araña roja Ácaros eriofidos Oidio, *Podosphaera* spp.	0,2-0,5 (1,4-5 Kg/ha)	6	7-10	700-1000	Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad
Frutales de pepita (manzano, peral, níspero, membrillero)	Araña roja Ácaros eriofidos Oidio, *Podosphaera* spp.	0,2-0,5 (1,4-5 Kg/ha)	6	7-10	1500-2000	Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad
Limonero	Ácaro de las maravillas	0,2-0,25 (3-5 Kg/ha)	6	Min. 10	1500-2000	Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad
Olivo	Negrilla	0,2-0,4 (1-4 Kg/ha)	1	-	800-1000	Aplicar en primavera, desde que las brotes alcanzan el 10% de su tamaño final hasta la apertura de las primeras flores (BBCH 31-60)
Sandía y Melón (aire libre e invernadero)	Ácaros, Araña roja Oidio de las curcubitáceas Oidio, *Golovinomyces* spp. Oidiopsis	0,2 (0,8-2 Kg/ha)	6	Min. 10	400-1000	Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad
Vid	Araña roja Erinosis de la vid Oidio de la vid	0,2-0,4 (1-4 Kg/ha)	8	7-10	500-1000	Aplicar desde 5-8 hojas desplegadas (BBCH 15-18)

*Puedes consultar el resto de cultivos para los que tiene registro en el MAPA.

Para los usos menores, según el artículo 51.5 del Reglamento (CE) Nº 1107/2009, la persona que utilice el producto será la responsable de la eficacia y toxicidad del producto fitosanitario. Ante la falta de ensayos biológicos realizados por el fabricante, éste no puede garantizar la eficacia ni la ausencia de riesgos fitosanitarios relacionados con la utilización de su producto en los usos menores y declina toda responsabilidad en caso de daños causados a los cultivos.

Beneficios

- Efecto preventivo y curativo contra oídio y ácaros.
- Excelente mojabilidad y dispersión en agua.
- Mayor cobertura de la superfície vegetal.
- Alta compatibilidad en mezclas con otros productos fitosanitarios.
- No genera resistencias.

PROPUxxx-Oct24

Niredis®

syngenta®