Soluciones para la agricultura

Nutrileaf® Zn-Mn
Plant Health

Nutrileaf® Zn-Mn

Nutrileaf® Zn-Mn es un fertilizante con un alto contenido en zinc y manganeso para ser utilizado en la prevención y/o corrección de carencia de estos micronutrientes. Puede aplicarse en numerosos cultivos. Su formulación lo hace especialmente adecuado para ser utilizado en el cultivo de cítricos.

La aplicación de Nutrileaf® Zn-Mn evita anomalías en el crecimiento, pérdidas de rendimiento y calidad de cosecha. El manganeso actúa directamente sobre la fotosíntesis, aumenta la formación de raíces laterales, influye en la reserva energética y activa el crecimiento de la planta al influir sobre el crecimiento celular. También incrementa el valor de la concentración de componentes determinantes como el ácido cítrico y la vitamina C.
El zinc está implicado en la producción de ciertas hormonas (en particular, auxinas), en la asimilación de dióxido de carbono para la fotosíntesis, en la síntesis de proteínas y en la producción de ARN.

Compártelo:

CARACTERÍSTICAS

N° DE REGISTRO:	--
PRESENTACIÓN:	5 L
COMPOSICIÓN:	Manganeso (Mn) 25% + Zinc (Zn) 35% p/v
FORMULACIÓN:	Liquido soluble
CLASIFICACIÓN:	
UDS./EMBALAJE:	2x5 L

Este sitio web usa cookies, si permanece aquí acepta su uso. Puede sabe más sobre su uso en nuestra política de cookies.
×

USOS AUTORIZADOS

Cultivo	Problema	Dosis	PS días
CEREALES	Aplicar en las plantas jovenes, repetir el tratamiento en ahijamiento y elongación del tallo	100-150 mL/hL	NP
CÍTRICOS	En las brotaciones de primavera, repetiren verano	100-150 mL/hL	NP
FRUTALES DE HUESO	Aplicar después de floración, repetir si fuera necesario	100-150 mL/hL	
FRUTALES DE PEPITA	Sobre las hojas jovenes después del cuajado	100-150 mL/hL	NP
OLIVO	Aplicar en primavera en los brotes, repetir si fuera necesario	100-150 mL/hL	NP
FRESA, ORNAMENTALES, OTRAS HORTÍCOLAS DE HOJA	Aplicar antes de floración	100-150 mL/hL	NP
OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES	Aplicar antes de floración, repetir si fuear necesario después de la formación de los frutos	100-150 mL/hL	NP
VID DE VINIFICACIÓN	Aplicar al comienzo de la brotación	100-150 mL/hL	NP

Recomendaciones de uso

Cítricos: utilizar 100-150 mL/hL en las brotaciones de primavera, repetir en verano.

Frutales de pepita (manzano, peral, etc.): aplicar 100-150 mL/hL sobre las hojas jóvenes después del cuajado. Repetir la aplicación 2-3 veces en verano si se considera necesario.

Frutales de hueso (melocotón, nectarino, cerezo, albaricoquero, etc.): hacer una primera aplicación a la dosis de 100-150 mL/hLdespués de la floración. Repetir el tratamiento 2-3 veces si fuera necesario durante
el período de crecimiento activo.

Este sitio web usa cookies, si permanece aquí acepta su uso. Puede sabe más sobre su uso en nuestra política de cookies.
×

Olivo: aplicar 100-150 mL/hL en primavera en los brotes. Repetir el tratamiento si fuera necesario.

Cultivos hortícolas y fresa: aplicar 100-150 mL/hL al principio de temporada, antes de floración.

Realizar el número de tratamientos necesarios con intervalos de 15-20 días.

Cultivos industriales (girasol, algodón, etc.): aplicar 100-150 mL/hL antes de floración. Repetir el tratamiento si fuera necesario después de la formación de los frutos.

Viña: Aplicar 100-150 mL/hL al comienzo de la brotación.

Cereales (trigo, cebada, arroz, maíz, etc.): aplicar 100-150 mL/hL en las plantas jóvenes, Repetir el tratamiento en el estado de ahijamiento y elongación de los tallos. Se podrán realizar 1-2 aplicaciones después de la formación de la espiga durante el periodo de crecimiento de los granos.

Fertirrigación
Aplicar una dosis general de 10-20 L/ha al principio de la temporada. Repetir la aplicación 2-3 veces si fuera necesario.

Medio Ambiente

--

Productos relacionados

Amalgerol®
Plant Health

Bo-La®
Plant Health

Aminagro® FF
Plant Health

Carnival®
Plant Health

Copper® 435
Plant Health

Ferasi®
Plant Health

Éste sitio web usa cookies, si permanece aquí acepta su uso. Puede sabe más sobre su uso en nuestra política de cookies.

×