BIAGRO

Ficha Técnica

NUTROPIT

CLORURO CÁLCICO PARA APLICACIÓN FOLIAR Y FERTIRRIGACIÓN



pH: 2

Características

NUTROPIT es un producto formulado a base de cloruro cálcico de alta concentración, especialmente recomendado para aquellos casos en que es necesario corregir deficiencias de calcio (*Bitter-pit* en manzano o *podredumbre apical* en tomate o pimiento, *tip burn* en lechuga y col china, etc.) aplicando este elemento sin aportar nada de nitrógeno.

NUTROPIT, debido a su elevada pureza, se puede mezclar con todo tipo de plaguicidas y nutricionales, excepto sales de hierro y caldos cúpricos, lo que lo hace idóneo cuando es necesario realizar muchos tratamientos para prevenir desórdenes producidos por la falta de calcio en fruto.

Se recomienda dirigir los tratamientos foliares sobre todo a fruto. Se recomienda también aplicarlo en post-recolección de frutos (manzana, peral, etc.), antes de introducirlas en frío conservación.

No se recomienda aplicar al suelo en zonas donde existan problemas de salinidad o en cultivos sensibles a los cloruros.

Riquezas garantizadas

Óxido de calcio (CaO) total	14,4% p/v (12,0% p/p)
Óxido de calcio (CaO) soluble en agua	14,4% p/v (12,0% p/p)

Dosis y forma de empleo

CULTIVOS DE FRUTO Y HOJA:
Foliar: 300-500 cc/hl
Riego localizado: 10-15 L/ha
Aplicar a partir del cuaje o formación de primeras hojas hasta maduración.

FRUTALES DE PEPITA:
Foliar: 300-500 cc/hl
Realizar 3-5 aplicaciones, iniciando los tratamientos desde caída de pétalos y con intervalos de 2-3 semanas.

Bioestimulantes Agricolas S.L. C/Jaime I, 8. 46560 Massalfassar (Valencia). Telf: +34 961417069 - biagro@biagro.es

Dosis y forma de empleo

CÍTRICOS:
Foliar: 300 cc/hl. Realizar 3–4 aplicaciones a partir del cuaje y espaciadas 3 semanas.

TRATAMIENTO POST-RECOLECCIÓN: 3 L/1000 L de agua. Mojar bien la fruta antes de meterla en la cámara de conservación.

Presentación

