FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PERSELYS LQ I

Código producto: AAPE01 / Rev. 1. Jul. 26

Producto: MEZCLA LÍQUIDA DE MICRONUTRIENTES QUELADOS CON AMINOÁCIDOS PARA APLICACIÓN FOLIAR Y FERTIRRIGACIÓN.

Apariencia: Abono líquido de color marrón

Contenido declarado:

DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN (p/p)
Aminoácidos libres	6 %
N Nitrógeno total	3 %
N orgánico	1,5%
N amoniacal	1,5%
Fe Hierro soluble en agua quelado por ESSHSA	0,5 %
Mn Manganeso soluble en agua quelado por EDTA	0,5 %
Zn Zinc soluble en agua quelado por EDTA	1 %

Contiene PERSELYS: aditivos vegetales y extracto de algas.
pH 4,3-6,3
Densidad: 1,16
Intervalo garantizado de buena estabilidad de la fracción quelada: pH 3 a 10

Aminograma Serina, prolina, ácido glutámico, glicina, ácido aspártico, valina, alanina, arginina, treonina, fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina.

Certificación ecológica: Producto utilizable en Agricultura Ecológica UE conforme a la Norma UNE 142.500 (CAAE).

Presentación: Garrafa de 5 y 10 L.

Transporte: Terrestre (RID-ADR): No aplica.

Marítimo (IMDG): No aplica.

Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido del sol y heladas. Temperatura mínima de almacenamiento 5 °C. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso.

Consignas de seguridad: P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.
Instituto nacional de toxicología nº telefónico: 91 562 04 20

Timac AGRO España, S.A. Pol. Arazuri-Orcoyen Calle C nº 32 - 31160 Orcoyen – NAVARRA - Telf: 948 32 45 00 - Fax: 948 32 45 32

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PERSELYS LQ I

Código producto: AAPE01 / Rev. 1. Jul. 26

Recomendaciones de uso:

Cultivo	Nº de aplic.	Momento de aplicación	Dosis foliar L/ha	Dosis radicular L/ha
Cítricos	1-3	Desde inicio de brotación	2-4	4-10
Frutales	1-3	Desde inicio de brotación	2-4	4-8
Hortícolas	2-6	Desde inicio de brotación y cada 15 días	2-4	5-10
Olivos, viña	1-3	Desde inicio de brotación	2-3	4-8
Industriales	2-5	Desde inicio de brotación	2-5	4-10
Extensivos	1-2	Desde germinación	1,5-3	-

Utilizar solo cuando sea necesario y respetando la dosis de aplicación. Las dosis se proponen como valores indicativos y deben adaptarse según el estadío del cultivo, el tipo de suelo y las condiciones climáticas.

Dilución: PERSELYS LQ I puede ser utilizado en aplicación foliar o radicular.

- Aplicación foliar: después de limpiar el pulverizador, llénelo de agua hasta la mitad y vierta PERSELYS LQ I agitando constantemente y con la dosificación indicada en las instrucciones de uso específicas. Mantener la agitación hasta finalizar el tratamiento.
- Aplicación radicular: diluya PERSELYS LQ I en la cuba de solución madre de acuerdo con la dosificación indicada en las instrucciones de uso específicas. Agítese antes de la aplicación. No lo utilice con temperaturas bajas. En épocas de calor aplicar a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde.

Compatibilidad:

PERSELYS LQ I es compatible con la mayoría de los fertilizantes solubles y con un gran número de productos de tratamiento, exceptuando los productos con pH fuertemente básico, aceites de petróleo, sustancias húmicas y productos ricos en calcio o magnesio. En caso de duda, realice previamente una prueba o consulte con nuestro personal técnico. Nuestra responsabilidad se limita a la garantía del producto en su envase original

Timac AGRO España, S.A. Pol. Arazuri-Orcoyen Calle C nº 32 - 31160 Orcoyen – NAVARRA - Telf: 948 32 45 00 - Fax: 948 32 45 32