FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

PLATINA 75

NÚMERO DE REGISTRO

No procede.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Aminoácidos libres (L-triptófano)…… 7,4 % p/p (75g/l)
Nitrógeno total…… 1 % p/p (1,03 g/l)
Nitrógeno orgánico…… 1 % p/p (1,03 g/l)

FORMULACIÓN

Liquido.

DESCRIPCIÓN

Producto a base de aminoácidos libres obtenidos por fermentación (proceso E. Coli en almidón) para aplicación foliar.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA



ATENCIÓN

H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
P280 Llevar gafas de protección, guantes de protección.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
EUH401 A fi n de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

PRESENTACIÓN

Envase de 1L.

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN

Uva de mesa (especialmente var. Crimson) Aumenta el tamaño y calidad de las bayas.
Dosis: 1 - 1,5 l/ha bayas tamaño guisante y repetir a los 7 - 10 días.
Frutales de hueso: nectarino, melocotón, etc. Mejora los calibres y reduce la sensibilidad al cracking.
Dosis: 1 l/ha en G-H (caída de capuchón) y un segundo tratamiento a 7 - 10 días.
Cerezo: Reducción de la sensibilidad al cracking.
Dosis: 0,65 - 1 l/ha al cambio de color. Repetir según climatología cada 7 - 10 días.

V.1 02/03/2018

FICHA TÉCNICA

Manzano y peral: Mejora el calibre y la calidad del fruto y reduce la sensibilidad al cracking.
Dosis: 1 l/ha 2 semanas después de floración. Procurar buena cobertura pero sin exceso de agua.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.