

Feromona *Prays oleae*

FICHA TÉCNICA | Feromona *Prays oleae*

NOMBRE: Feromona para *Prays oleae* (Polilla del olivo)

INGREDIENTES:

- Ingredientes activos: (Z)-7-Tetradecenal

FORMATO:

- Difusor en septo de goma o caucho, con 1 mg de ingredientes activos.

FUNCIÓN: Monitoreo.

MODO DE ACCIÓN: atracción sexual.

- La feromona sintética de *Prays oleae* se ha fabricado para imitar la feromona sexual natural liberada por las hembras. La feromona causa una reacción de comportamiento específica de los machos para atraerlos a la fuente de feromonas para la contención y el control.

CULTIVOS RECOMENDADOS:

Es una plaga que se ve, principalmente, en cultivos de cítricos.



TRAPcontrol DELTA

TRAMPA:

- Se recomienda su uso con TRAPcontrol DELTA para monitoreo y TRAPcontrol FUNNEL para captura masiva.
- Se recomienda sustituir la base engomada de cuando ésta pierda su capacidad adhesiva y/o vaciar el polillero cuando este se encuentre lleno.



TRAPcontrol Polillero FUNNEL

MANEJO:

- El difusor debe colocarse en el centro de la base engomada de la trampa Delta o en la cestita en el caso del Polillero.
- Las trampas deben colocarse en el tercio superior de la copa de los árboles. Se debe asegurar que las entradas de las trampas estén libres de ramas y hojas que las obstruyan.
- Las trampas deben colocarse antes de la aparición de los primeros brotes florales.
- Revisar las trampas de manera regular para determinar el nivel poblacional en la zona. Cuando las trampas de monitoreo presenten entre 7 y 21 polillas por trampa y semana, debe considerarse una estrategia de control como la captura masiva.

DENSIDAD DE TRAMPAS:

- Monitoreo: de 1 a 2 trampas/ha en arboledas grandes y uniformes. En rodales pequeños, mixtos o menos densos, colocar entre 3 y 4 trampas/ha.
- Trampeo masivo: para un control adecuado, se recomiendan entre 20 y 50 trampas/ha dependiendo del tamaño de población, de tamaño y uniformidad de la arboleda y del área circundante (las polillas pueden desplazarse desde las arboledas cercanas).

DURACIÓN:

Entre 4 y 6 semanas, dependiendo de la temperatura. Renovar el dosificador pasado este periodo o cuando el número de capturas sea muy elevado.

CONSEJO DE MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN:

- No tocar directamente con las manos el difusor donde va impregnado el atrayente. Es aconsejable lavarse las manos antes de manipular el difusor para evitar intervención de olores, e inmediatamente después de su uso. Se recomienda el uso de guantes descartables durante su uso.
- Evitar el contacto directo prolongado, mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No comer, ni beber durante su uso. En caso de contacto con la piel y ojos, enjuague con abundante agua. En caso de ingesta o irritación consulte a su médico.
- Su conservación y duración sin abrir dependerá de la temperatura a la que se mantenga, siendo:
    - 12 meses refrigerado <10ºC
    - 24 meses si se congela (<-4ºC)
- Mantener en el envase original.

Este documento es meramente informativo; pregúntenos por otros formatos disponibles. Comprueba con las autoridades locales que productos están autorizadas para su uso. Este documento es solo informativo, Agrobío no es responsable de un uso indebido del producto.

Distribuidor:
Agrobío S.L.
Ctra Nacional 340, km419, 81
04745 La Mojonera (Almería)
España