Soluciones para la agricultura

Qentivia
Fungicida

Qentivia

Fungicida preventivo con una excelente actividad contra Botritis, actúa mediante la inhibición del crecimiento del tubo germinativo del hongo en la superficie de la planta, y en los primeros estadios de colonización de la hoja.
Grupo FRAC 17.

Compártelo:

CARACTERÍSTICAS

N° DE REGISTRO:	ES-00324
PRESENTACIÓN:	1 Kg
COMPOSICIÓN:	Fenhexamida 50% p/p
FORMULACIÓN:	Granulado dispersable en agua (WG)
CLASIFICACIÓN:	
UDS./EMBALAJE:	

USOS AUTORIZADOS

Cultivo	Problema	Dosis	PS días
ALBARICOQUERO, MELOCOTONERO	Monilia (Monilia spp)	0,1-0,15%	1

Éste sitio web usa cookies, si permanece aquí acepta su uso. Puede sabe más sobre su uso en nuestra política de cookies.
×

Cultivo	Problema	Dosis	PS días
BERENJENA, CALABACÍN	Podredumbre gris (Botrytis cinerea)	0,15%	1
CEREZO	Monilia (Monilinia fructigena)	0,1-0,15%	1
CIRUELO	Monilia (Monilia spp)	0,1-0,15%	1
FRAMBUESA	Botrytis cinerea y Botrytis spp	0,15%	1
FRESA	Podredumbre gris (Botrytis cinerea)	0,15%	1
ARBUSTOS Y PEQUEÑOS ÁRBOLES ORNAMENTALES, CONÍFERAS, FRONDOSAS, ORNAMENTALES HERBÁCEAS, PALMÁCEAS, PALMERA DATILERA	Botrytis spp	0,15%	NP
JUDÍA VERDE	Botrytis spp	0,15%	1
LECHUGA Y SIMILARES	Podredumbre de la lechuga (Sclerotinia minor) y Botrytis spp	0,15%	3
PEPINO, PIMIENTO, TOMATE	Botrytis spp	0,15%	1
UVA DE MESA	Podredumbre gris (Botrytis cinerea)	0,1-0,15%	7
VID DE VINIFICACIÓN	Podredumbre gris (Botrytis cinerea)	0,1-0,15%	14
ARÁNDANO, ZARZAMORA	Botrytis spp	0,15%	1

Recomendaciones de uso

Albaricoquero y melocotonero: Realizar de 1-4 aplicaciones en intervalos de 7 días con un volumen de caldo de 500-1.000 L/ha.
Realizar un máximo de 4 aplicaciones por estación: 2x BBCH 61-69 + 2x BBCH 81-89.
Arándano, mirtilo y zarzamoras (invernadero): Realizar de 1-4 aplicaciones en intervalos de 10 días con un volumen de caldo de 1.000 L/ha. BBCH 55-89.
Arbustos y pequeños arboles ornamentales, coníferas, frondosas, ornamentales herbáceas,

Este sitio web usa cookies, si permanece aquí acepta su uso. Puede sabe más sobre su uso en nuestra política de cookies.
×

palmáceas y palmera datilera (aire libre):
Realizar 1-4 aplicaciones en intervalos de 7-14 días, con una dosis máxima de 1,5 Kg/ha y un volumen de caldo de 300-1.000 L/ha.
Arbustos y Pequeños arboles ornamentales, coníferas, frondosas, ornamentales herbáceas, palmáceas y palmera datilera (invernadero):
Realizar 1-4 aplicaciones en intervalos de 7 días, con una dosis máxima de 1,25 Kg/ha.
Berenjena (aire libre): Realizar 1-3 aplicaciones en intervalos de 10-14 días con un volumen de caldo de 300-1.000 L/ha, con una dosis máxima de 1,5 Kg/ha. BBCH 55-89.
Berenjena (invernadero): Realizar 1-3 aplicaciones en intervalos de 7 días, con una dosis máxima de 1,25 Kg/ha.
Calabacín (aire libre): Realizar 1-3 aplicaciones en intervalos de 8-14 días con un volumen de caldo de 300-1.000 L/ha, con una dosis máxima de 1,5 Kg/ha. BBCH 55-89.
Calabacín (invernadero): Realizar 1-3 aplicaciones en intervalos de 10 días, con una dosis máxima de 1,25 Kg/ha.
Cerezo: Realizar 1-4 aplicaciones en intervalos de 10 días con un volumen de caldo de 500-1.000 L/ha. Realizar un máximo de 4 aplicaciones por estación: 2x BBCH 61-69 + 2x BBCH 81-89.
Ciruelo: Realizar de 1-4 aplicaciones en intervalos de 7 días con un volumen de caldo de 1.000 L/ha. Realizar un máximo de 4 aplicacione por estación: 2x BBCH 61-69 + 2x BBCH 81 89.
Frambueso y Fresal (aire libre): Realizar de 1-4 aplicaciones en intervalos de 7-14 días con un volumen de caldo de 300-1.000 L/ha. BBCH 55-89.
Frambueso (invernadero): Realizar de 1-4 aplicaciones en intervalos de 10 días con un volumen de caldo de 1.000 L/ha.
Fresal (invernadero): Realizar de 1-4 aplicaciones en intervalos de 7 días con un volumen de caldo de 1.000 L/ha.
Judía Verde (aire libre): Realizar 1-3 aplicaciones en intervalos de 10 días con un volumen de caldo de 300-1.000 L/ha. BBCH 55-79.
Judía Verde (invernadero): Realizar de 1-3 aplicaciones en intervalos de 8 días con un volumen de caldo de 200-1.000 L/ha.
Lechuga y similares (aire libre): Realizar de 1-2 aplicaciones en intervalos de 7-14 días con un volumen de caldo de 300-1.000 L/ha. BBCH 13-49.
Pepino (aire libre): Realizar de 1-3 aplicaciones en intervalos de 10-14 días con un volumen de caldo de 300-1.000 L/ha, con una dosis máxima de 1,5 Kg/ha. BBCH 61-89.
Pepino (invernadero): Realizar de 1-3 aplicaciones en intervalos de 8 días, con una dosis máxima de 1,25 Kg/ha, BBCH 55-89.
Pimiento (invernadero): Realizar de 1-3 aplicaciones en intervalos de 8 días, con un volumen de caldo de 300-1.000 L/ha y con una dosis máxima de 1,25 Kg/ha, BBCH 55-89.
Tomate (aire libre): Realizar de 1-3 aplicaciones en intervalos de 7-14 días con un volumen de caldo de 300-1.000 L/ha, con una dosis máxima de 1,5 Kg/ha. BBCH 55-89.
Tomate (invernadero): Realizar de 1-3 aplicaciones en intervalos de 7 días, con una dosis máxima de 1,25 Kg/ha.
Vid de mesa y vid de vinificación: Realizar 1 única aplicación a dosis máx. de 1,5 kg/ha o 2 aplicaciones con intervalo de 10-14 días a dosis máx. de 1 kg/ha, con un volumen de caldo de 1.000 L/ha. BBCH 71-85.

Este sitio web usa cookies, si permanece aquí acepta su uso. Puede sabe más sobre su uso en nuestra política de cookies.

×

Productos relacionados

Airone®

Fungicida

Airone® SC Blue

Fungicida

Alial®

Fungicida

Alial® 80WG

Fungicida

Alial® Doble

Fungicida

Azaka® 25 SC

Fungicida

Éste sitio web usa cookies, si permanece aquí acepta su uso. Puede sabe más sobre su uso en nuestra política de cookies.

×