FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RHIZOVIT PROCESS 6

Código producto : AARZ51 / Rev.1. Jul. 24

Producto: **ABONO NPK (Ca – Mg – S) 8 – 5 – 18 (2 – 2 – 20)**

Apariencia: Abono granulado de color rubí.

Especificaciones:
Contenidos declarados:

DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN
Nitrógeno (N) total	8 %
Nitrógeno (N) amoniacal	6 %
Nitrógeno (N) ureico	2 %
Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en el citrato de amonio neutro y en agua	5 %
Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua	4 %
Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua	18 %
Óxido de calcio (CaO) soluble en agua	2 %
Óxido de magnesio (MgO) total	2 %
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua	0,6%
Trióxido de azufre (SO_3) total	20 %
Trióxido de azufre (SO_3) soluble al agua	18%

Densidad: 1±0.05

Clase granulométrica: El 98 % pasa por el tamiz de 2.5 a 5.5 mm

Presentación: Granel, BIG-BAG de 600 kg, sacos de 25 Kg.

Transporte:
Terrestre (RID-ADR): No aplica.
Marítimo (IMDG): No aplica.

Almacenamiento: Almacenar en lugares frescos y secos.

Consignas de seguridad:
UFI : 35Q0-G0CD-C00E-GMNC
Contiene: SUPERFOSFATO SIMPLE; CAS :8011-76-5 / EC : 232-379-5
ES/ H318 - Provoca lesiones oculares graves. P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización. P280 - Llevar gafas de protección. P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico.
Instituto nacional de toxicología nº telefónico: 91 562 04 20.

Recomendaciones de uso: Fertilizante complejo granulado con triple acción sobre suelo, raíz y equilibrio de las formas nitrogenadas. Maximiza el aprovechamiento de los nutrientes, tanto de los aportados con el fertilizante como de los que están presentes en el suelo. Aplicación en fondo o cobertera, dirigido principalmente para cultivos extensivos (cereal de invierno, cereal de primavera, alfalfa), hortícolas, praderas y leñosos (frutales, viña y cítricos).

Las dosis varían entre 150 y 1200 Kg / ha dependiendo de las extracciones previstas del cultivo y de la analítica de los suelos. Este abono contiene Urea, que puede liberar amoniaco y tener repercusiones sobre en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales, se deben de tomar las medidas correctoras apropiadas.

Dirección:
Timac AGRO España, S.A. – INABONOS
Pol. Arazuri-Orcoyen Calle C nº 32
31160 Orcoyen – NAVARRA
Telf: 948 32 45 00 Fax: 948 32 45 32