NOMBRE DEL PRODUCTO

SEAMAC PCT

CARACTERÍSTICAS

Es una solución que contiene en su formulación 150 g/L de extracto de algas naturales 100% *Ascophyllum nodosum*. Seamac PCT aumenta la absorción de nutrientes, la asimilación del nitrógeno y la producción de hidratos ed carnono, consiguiendo un mejor desarrollo de la planta y un mayor rendimiento y calidad de la cosecha.
También está indicado para la recuperación de los cultivos que hayan sido sometidos a circunstancias adversas (heladas, sequías, etc.).

COMPOSICIÓN

Contenido declarado:

Componente	Contenido declarado
Extracto de algas naturales de *Ascophyllum nodosum*	15% p/V (150 g/L)
Ácido algínico	1,5% p/p (1,62% p/V)
Manitol	0,5% p/p (0,54% p/V)

FORMULACIÓN

Líquido soluble [SL]

Aplicación foliar: respetando las siguientes recomendaciones de uso.

Cultivo	Dosis / Momento de Aplicación
Cereales	1,25 L/ha en otoño, al inicio de ahijamiento
	2,5 L/ha en primavera, al inicio del encañado.
Semillas oleaginosas	2,5 L/ha en otoño, aplicar cuando la planta tiene hojas verdaderas.
	3 L/ha en primavera.
Remolacha azucarera	3 L/ha. Aplicar cuando el cultivo tiene 6 hojas totalmente expandidas.
Patatas	3 L/ha. Se puede aplicar hasta que los tubérculos tienen 15x20 cm.
Leguminosas	3 L/ha. Aplicar inmediatamente antes de la floración.
Cebolla, ajo, puerro y nabos	2 L/ha. Realizar 3 tratamientos: 1º 2-3 semanas después de la emergencia. Los siguientes con intervalos de 14 días.
Col, coliflor, brócoli, alcachofa y lechuga	2 L/ha. Aplicar desde que la planta tiene 4-6 hojas verdaderas hasta la formación del cogollo, con intervalos de 14 días.
Tomate, pimiento y berenjena	2 L/ha. Realizar 4 tratamientos: el primero después del transplante y los siguientes a intervalos de 14 días.
Fresa y fresón	2 L/ha. Realizar 3 tratamientos: 1º al inicio de brotación, 2º antes de floración y 3º con los primeros frutos cuajados.
Endibia, espinaca y zanahoria	2 L/ha. Realizar 3 tratamientos: el primero con 3-4 hojas verdaderas y los restantes con un intervalo de 15 días.
Cucurbitáceas	2 L/ha. Realizar el primer tratamiento con 3-4 hojas y repetir a intervalos de 14 días.
Espárrago	2 L/ha. Aplicar desde el comienzo hasta el final del desarrollo foliar.
Olivo	0,2-0,3%. Realizar 2-3 tratamientos, entre el inicio de brotación y floración.
Cítricos	2 L/ha. Realizar 3 tratamientos: 1º al inicio de floración, 2º en caída de pétalos y 3º en el cuajado de frutos.
Frutales de hueso	2 L/ha. Realizar 3 tratamientos: 1º principio de floración, 2º caída de pétalos y 3º cuajado.
Frutales de pepita	2 L/ha. Realizar 3-4 tratamientos: 1º desborre, 2º botón rosa y los restantes en floración y caída de pétalos.
Vid	2 L/ha. Realizar 3 tratamientos: 1º estadío de 5-6 hojas, 2º antes de floración y 3º engorde.
Platanera	2 L/fanega. Realizar 3 tratamientos desde la salida del invierno.
Césped	4-6 L/ha. En invierno y después de cada corte.
Alfalfa	3 L/ha. Aplicar después de cada corte.
Semilleros	20 cc/10L. Aplicar una vez arraigadas las plantas.
Viveros/ floricultura	1%. Aplicar en fertirrigación cada 4 semanas.

Fertirrigación: Aplicar de 6 a 8 L/ha, según desarrollo del cultivo, repitiendo cada 10-14 días si fuera necesario.

PRECAUCIONES

En el efecto y modo de acción de este producto pueden intervenir numerosos factores que es imprescindible conocer (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.) para realizar las correspondientes aplicaciones en el momento y la forma que permitan optimizar el efecto indicado. El usuario será responsable de los daños causados por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Antes de realizar cualquier mezcla, consulte al Servicio Técnico de FMC o a su distribuidor.

CONSIGNAS DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar respirar los vapores o la niebla de pulverización.
- No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- Contiene 1,2-Benzisotiazolin-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica.

PRIMEROS AUXILIOS

- Si ocurre la exposición, no espere a que se desarrollen los síntomas, de inmediato comience los procedimientos descritos a continuación: En caso de intoxicación, llame al teléfono de emergencia . No deje al intoxicado sólo en ningún caso.
- En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con jabón y agua. Consulte a un médico si se desarrolla irritación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar los ojos con agua corriente durante 15 minutos. Consúltese a un médico.
- En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua. Si está consciente, suministrar ½ litro de agua para que beba inmediatamente. No inducir el vómito. Consúltese a un médico.
- En caso de inhalación, retirar al afectado de la exposición, garantizando la propia seguridad mientras se realiza. Consúltese a un médico.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Enjuague enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Este envase una vez vacío depués de utilizar su contenido, es un residuo poligroso, por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recpeción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.
No limpiar el equipo de aplicación de producto cerca de aguas superficiales.
Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN

Asegurarse de que existe ventilación mecánica del área.

Este producto es un abono y sólo puede ser utilizado para las aplicaciones para las que se ha diseñado, de acuerdo con una etiqueta.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar a una temperatura superior a 5°C. Almacenar en un lugar fresco, bien ventilado. Proteger de las heladas. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el envase herméticamente cerrado. Mantener alejado de la luz solar directa.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de las mezclas, aplicación, climatología, etc.) La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes