Seamac® Rhizo

Nombre	**Seamac® Rhizo**
Acción	Bioestimulante promotor de crecimiento radicular y rendimiento de cultivo.
Composición	Abono líquido NPK con extracto de algas y aminoácidos, con Boro (B), y/o Cobre (Cu), y/o Hierro (Fe), y/o Manganeso (Mn), y/o Molibdeno (Mo), y/o Zinc (Zn) para aplicación foliar y fertirrigación.
Formulación	Abono hidrosoluble

CARACTERÍSTICAS

SEAMAC® RHIZO es un Bioestimulante a base de extracto natural de *Ascophyllum nodosum* enriquecido con aminoácidos y elementos nutricionales, mejorador de la calidad de la cosecha. Actúa promoviendo la formación de nuevas raíces, consiguiendo un establecimiento más rápido del cultivo en campo y su recuperación ante situaciones de estrés abiótico o alta demanda como plena producción, además de favorecer la absorción de nutrientes del suelo.

Contenido declarado

Nitrógeno (N) total .....3,84% p/p
Nitrógeno (N) orgánico: ..... 3,47% p/p
Fósforo (P) ..... 4,14% p/p
Potasio (K) ..... 2,80% p/p
Boro (B)..... ...0,08% p/p
Cobre (Cu) ..... 0,048% p/p
Hierro (Fe)..... ...0,05% p/p
Manganeso (Mn)..... ..0,10% p/p
Molibdeno (Mo)..... 0,01% p/p
Zinc (Zn) ..... 0,08% p/p
Manitol 0,36%p/p
Algas *Ascophyllum nododum*.....14,8% p/p
Aminoácidos libres ..... 2,8% p/p

Aminograma cualitativo:

Alanina:	0,32% p/p	Lisina:	0,28% p/p
Arginina:	<0,10% p/p	Metionina:	<0,09% p/p
Ácido aspártico:	<0,08% p/p	Fenilalanina:	0,14% p/p
Ácido glutámico:	0,69% p/p	Prolina:	0,30% p/p
Glicina:	0,36% p/p	Serina:	<0,07% p/p
Hidroxiprolina:	<0,05% p/p	Tirosina:	<0,01% p/p
Histidina:	<0,10% p/p	Treonina:	<0,07% p/p
Isoleucina:	0,09% p/p	Triptófano:	<0,05% p/p
Leucina:	0,18% p/p	Valina:	0,19% p/p

RECOMENDACIONES DE USO: APLICACIONES Y DOSIS

Cultivos	Dosis	Momento de aplicación
Cítricos	2,5 – 5 L/ha en agua de riego	1er tratamiento a inicio de brotación (5 L/ha), repetir tratamientos tras cuaje del fruto (2,5 L/ha) y durante el engorde (2,5 L/ha). En situaciones de estrés o alta demanda.
Frutales	2,5 – 5 L/ha en agua de riego	1er tratamiento a inicio de brotación (5 L/ha) y 1-2 tratamientos durante el engorde del fruto (2,5 L/ha). En situaciones de estrés o alta demanda.
Olivo	2,5 L/ha (olivar tradicional) – 5 L/ha (olivar intensivo) en agua de riego, o pulverización foliar 0,2%	Tratamientos a inicio de nueva brotación (aprox. Marzo) e inicio de engorde del fruto. En situaciones de estrés o alta demanda.
Hortícolas invernadero o aire libre, fresa	2 – 3 L/ha en agua de riego	1er tratamiento tras trasplante, repetir tratamientos cada 15-20 días o cuando se prevea una situación de estrés o alta demanda. Al menos 3 tratamientos por ciclo de cultivo.
Alcachofa	2 – 3 L/ha en agua de riego	1er tratamiento a inicio de brotación (brotes de 10 cm), repetir 2 tratamientos cada 15-20 días. En situaciones de estrés o alta demanda.
Patata	2 – 3 L/ha en agua de riego, o pulverización foliar 0,2%	1er tratamiento con las primeras hojas extendidas, repetir 2 tratamientos cada 15-20 días. En situaciones de estrés o alta demanda.
Cebolla	2 – 3 L/ha en agua de riego, o pulverización foliar 0,2%	2 tratamientos espaciados 20 días a inicio de cultivo. En situaciones de estrés o alta demanda.
Viña y uva de mesa	2 – 3 L/ha en agua de riego, o pulverización foliar 0,2%	1er tratamiento a inicio de brotación (brotes de 5 a 10 cm), 2-3 tratamientos durante alargamiento de racimos y engorde. En situaciones de estrés o alta demanda.
Algodón	1,5 – 2 L/ha en agua de riego o pulverización foliar	1er tratamiento tras emergencia del cultivo, repetir 2-3 tratamientos cada 20 días. En situaciones de estrés o alta demanda.
Cereal, maíz y	1,5 – 2 L/ha en agua de riego o	1-2 tratamientos a inicio de cultivo tras emergencia. En situaciones de

girasol	pulverización foliar	estrés o alta demanda.
Arroz	1,5 – 2 L/ha	1er tratamiento con 3-4 hojas, 2º entre fin de ahijamiento y aparición de hoja bandera. En situaciones de estrés o alta demanda.
Viveros y nuevas plantaciones de leñosos	5 – 10 ml/plantón en agua de riego, o pulverización foliar 0,2%	Tratamientos tras trasplante en campo cada 20 días, o en viveros durante desarrollo vegetativo.
Ornamentales herbáceas y leñosas	2 – 3 L/ha en agua de riego, o pulverización foliar 0,2%	Tratamientos cada 15-20 días.

PRECAUCIONES Y COMPATIBILIDAD

SEAMAC RHIZO es compatible con un amplio número de productos. Para cualquier duda con respecto al uso de este producto, contacte con nuestro Departamento Técnico.

RIESGOS TOXICOLÓGICOS



- Provoca irritación ocular grave
- Llevar guantes y prendas de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamentecon agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta útil. Seguir aclarando.
- Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-ona. Puede producir una reacción alérgica.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Proteger de las heladas. Almacenar a una temperatura superior a 5°C.

Mantener alejado de la luz solar directa. Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc) La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta

de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS S.A.U.
Paseo de la Castellana, 257 – 5ª planta. 28046 Madrid
Tlf. 915 530 104
www.fmcagro.es