Troper® SL

Inductor de azúcares y maduración.

Contenido Declarado

Óxido de calcio (CaO): 12,3 % p/p
Manitol: 0,3 % p/p

INFORMACIÓN ADICIONAL

Especie de alga: *Ascophylum nodosum*
Ácido algínico: 1,0 % p/p
Óxido de Magnesio (MgO): 0,2% p/p
Boro (B): 0,4 % p/p
Derivado de polisacáridos: 21,0 %

EXTRACCIÓN PROPIA
PLYMAG

Características físicoquímicas

ASPECTO	Líquido
COLOR	Marrón
pH (Directo)	3,0
DENSIDAD	1,35 kg/L



Características

Troper® SL es un bioestimulante especialmente indicado para las fases finales del cultivo. **Troper® SL** estimula la síntesis de ATP, facilitando y acelerando la conversión de los polisacáridos en azúcares asimilables por el fruto, incrementando los grados Brix y adelantando la maduración.

Gracias a su formulación**, Troper® SL** se caracteriza por:

- Aumentar la síntesis de azúcares y coloración del fruto.
- Favorece la precocidad en la maduración.
- Aumenta la calidad de vida postcosecha.

Forma de aplicación y dosis

Troper® SL está desarrollado para aplicación foliar y puede aplicarse en todo tipo de cultivos con fruto, especialmente en aquellos con una fuerte demanda de calcio y en momentos clave como **desarrollo de fruto y maduración**:

APLICACIÓN FOLIAR	
Dosis (ha/aplicación)	0.2-0.4 %
Nº aplicaciones ciclo	2-3

APLICACIÓN RADICULAR	
Dosis (litros hectárea/aplicación)	3-5 L/ha
Nº aplicaciones ciclo	2-3
Concentración máxima recomendada	10%

Indicaciones de uso

Troper® SL no presenta complicaciones a la hora de su preparación. En caso de mezcla, se recomienda seguir el orden adecuado para evitar interferencias físicas. Se recomienda realizar siempre el tratamiento con condiciones meteorológicas favorables para la aplicación.

No mezclar con productos que contengan fósforo, sulfatos o derivados de cobre.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). PLYMAG, S.L. garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.