Quelato de hierro

Abono CE

- Contenido declarado:

Agente quelatante EDDHA

Hierro (Fe) soluble en agua: 6%

Hierro (Fe) quelatado (isómero orto-orto*): **mín. 5%**

Estable a pH: 3,5-12

**Método EN 13368-2*

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis adecuadas.

AUTORIZADO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA.

CARACTERÍSTICAS:

Excelente formulación en microgránulos altamente solubles, obtenida por un exclusivo proceso de fabricación.

Corrector de clorosis férrica a base de Fe EDDHA, molécula que tiene gran afinidad por el hierro y capacidad para movilizarlo, transportarlo y ponerlo a disposición de las plantas.

De todos los isómeros posibles, la forma orto-orto sería la más estable, manteniendo esta estabilidad en condiciones desfavorables, pH elevados, exceso de metales pesados etc., y por lo tanto, la que da persistencia al producto.

UNIC-QUEL tiene un alto contenido en posición orto-orto (5%). Su actuación en el suelo presenta las siguientes propiedades:

1. **Buena estabilidad:** el comportamiento del producto es independiente del tipo de suelo y su pH. Actúa también en suelos muy alcalinos.
2. **Acción rápida:** La fácil absorción del producto por las raíces, supone una rápida recuperación del cultivo.
3. **Alta eficacia:** La alta calidad de la molécula proporciona una total recuperación de las plantas afectadas por clorosis férrica.
4. **Acción persistente:** aplicado a dosis apropiadas los resultados se mantienen durante toda la campaña.

MODO DE APLICACIÓN:

Se puede utilizar con todos los sistemas de aplicación (hoyos alrededor del árbol, inyección al suelo mediante reja o lanza inyectora, debido a su excelente solubilidad en fertirrigación, tanto en riego localizado como a manta) y en todos los cultivos que presenten carencia de hierro. Se recomienda utilizarlo principalmente al comienzo de la actividad vegetativa, para asegurar una buena brotación, floración y cuaje, aunque dependiendo del grado de clorosis se pueden realizar aplicaciones durante todo el ciclo vegetativo.

DOSIS:

Las dosis de aplicación dependen de varios factores como: tamaño de la planta, intensidad de la clorosis, condiciones del terreno, etc.

CULTIVOS	INCORPORACIÓN AL SUELO	RIEGO POR GOTEO
FRUTALES, CÍTRICOS, AVELLANO Y OTROS LEÑOSOS		
Viveros	2-4 g/m2	2-4 g/m2
Plantones	5-10 g/árbol	3-10 g/árbol
Árboles jóvenes o espaldera	15-20 g/árbol	10-15 g/árbol
Árboles en producción	30-40 g/árbol	20-30 g/árbol
Árboles muy afectados de clorosis o muy desarrollados	60-90 g/árbol	40-60 g/árbol
PARRAL Y PLATANERA	15-20 g/pie	10-12 g/pie
VIÑEDO		
Cepas jóvenes	3-5 g/pie	2-3 g/pie
Cepas desarrolladas	5-10 g/pie	3-6 g/pie
FRESAL	5-7 Kg/ha	
HORTÍCOLAS Y ORNAMENTALES		
Inicio de desarrollo	3-5 g/m2	0,5-1 g/m2
Pleno desarrollo	5-10 g/m2	1-2 g/m2

ALMACENAMIENTO:

Mantener los recipientes bien cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

ADVERTENCIA:

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de las mezclas, aplicación, climatología, etc.) La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.