FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

WELGRO®STANDARD PLUS

NÚMERO DE REGISTRO

No procede – ABONO CE

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total..... 17% p/p
Nítrico..... 3,3% p/p
Amoniacal..... 5,0% p/p
Ureico..... 8,7% p/p
Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y en agua.....30% p/p
Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua.....30% p/p
Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua..... 15% p/p
Boro (B) soluble en agua.....0,02% p/p
Hierro (Fe) soluble en agua.....0,13% p/p
Hierro (Fe) quelatado con EDTA.....0,13% p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua.....0,05% p/p
Manganeso (Mn) quelatado con EDTA.....0,05% p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua.....0,005% p/p
Zinc (Zn) soluble en agua.....0,06% p/p
Zinc (Zn) quelatado con EDTA.....0,06% p/p

Intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción quelatada: 3-6

FORMULACIÓN

Cristales solubles en agua.

CARACTERISTICAS

Abono NPK 17-30-15 con micronutrientes: Boro (B), hierro (Fe), manganeso (Mn), molibdeno (Mo) y zinc (Zn)

WELGRO® STANDARD *plus* es un fertilizante foliar de alta concentración y calidad contrastada, totalmente soluble. Permite un aporte equilibrado de macro y microelementos, necesarios para un buen desarrollo de la planta. Su alto contenido en Fósforo lo convierte en un producto especialmente indicado en primavera, para favorecer la floración y el cuajado. Posteriormente se recomienda continuar los tratamientos con **WELGRO® OLIVO CLASSIC, WELGRO® FRUIT o WELGRO® POTASIO.**

PRESENTACIÓN

Envases de1,)5 y 20kg.

FICHA TÉCNICA

APLICACIONES RECOMENDADAS Y DOSIS

Puede aplicarse a cualquier tipo de cultivo: olivo, frutales, cítricos, fresales, viñedos y parrales de vid, hortalizas, patata, remolacha, cebollas, ornamentales, etc.

- Hortalizas y fresales: aplicar cada 15 días a la dosis de 200-250 g/hl hasta el final de la floración (cultivos con fruto) o hasta el final del cultivo (cultivos de hoja comestible).
- Patata y remolacha: tratamientos quincenales a la dosis de 2-3 kg/ha hasta el inicio de la tuberización. Después, continuar los tratamientos con **WELGRO® POTASIO** (2-3 kg/ha) para mejorar el contenido en almidón/sacarosa.
- Cebolla: realizar dos tratamientos, en pulverización normal, mezclándolo con un mojante:
1º: en el estadio de tres hojas, a la dosis de 1 kg/ha.
2º: al inicio de la formación del bulbo, a la dosis de 1,5 kg/ha.
Tres semanas después del segundo tratamiento, aplicar **WELGRO® POTASIO** a la dosis de 2-3 kg/ha.
- Árboles frutales y cítricos: realizar un tratamiento después de la floración, a la dosis de 200-300 g/hl. Después del cuajado, tratar con **WELGRO® POTASIO**.
- Olivo: realizar dos tratamientos, añadiendo un mojante.
1º: brotación, a la dosis de 0,5-1 kg por 100 litros de agua.
2º: al inicio de la floración (10% flor abierta), a la dosis de 300-500 g por 100 litros de agua.
Después del cuajado, se recomienda realizar dos tratamientos a la dosis de 150-250 g/hl (cítricos) con **WELGRO® POTASIO** y 500-1000 g/hl (olivo) con **WELGRO® OLIVO CLASSIC** o **WELGRO® POTASIO OLIVO *plus***.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en su envase original cerrado en un lugar seco y al abrigo de temperaturas extremas

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente