Zaster



Solución de abono a base de DOS complejos orgánicos de COBRE Nutriprotector

Composición

Cobre (Cu) soluble en agua: 7,16%

pH = 7,2

Liquido Soluble (SL)

PRESENTACIÓN

Garrafa 5L (Caja de 4x5L)

Garrafa 20 L

COMPATIBILIDADES

Zaster es compatible con la mayoría de los productos habitualmente empleados en los tratamientos agrícolas. No mezclar con productos hormonales, aceites, polisulfuros. Para mezclas con fungicidas, consultar con el Departamento Técnico de la empresa.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA

No clasificado toxicológicamente.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Evitar el contacto con ojos, piel y vestido, utilizando la indumentaria adecuada y observando las precauciones habituales en el manejo de productos químicos. Almacenar los envases cerrados herméticamente en lugar fresco y seco.

CLASIFICACIÓN ADR

No clasificado como peligroso para el transporte por carretera.

LEGISLACIÓN APLICABLE

Fertilizante.

Abono Nacional.

ADVERTENCIA

Las características técnicas presentadas en este informe tienen carácter informativo y pueden ser susceptibles de variación sin previo aviso.

Características/Propiedades

Zaster es un abono líquido. En su composición intervienen dos tipos diferentes de moleculas cúpricas: un **complejo organometálico de cobre** y una **molécula orgánica hidrocarbonada**.

El cobre es esencial en la planta para la biosíntesis de la lignina y los complejos enzimáticos intervinientes en la fotosíntesis, así como en la respiración celular y el metabolismo de carbohidratos y proteínas. A su vez, actúa bloqueando enzimas esenciales para el funcionamiento de agentes patógenos, por lo que aporta un efecto protector frente a distintas enfermedades.

El complejo organometálico del formulado interacciona con la membrana del microorganismo facilitando así la entrada del ión cobre. Por otro lado, su molécula hidrocarbonada favorece el efecto sistémico.

La especial formulación de **Zaster** permite que sus compuestos activos penentren rápidamente por el sistéma radicular de la planta, traslocándose vía xilemática hasta su parte aérea. Esta propiedad otorga al producto un efecto protector a nivel radicular, vascular y foliar.

Dosis y modo de empleo

Indicado para: Frutales de hueso, Frutales de pepita, Subtropicales, Olivo, Cítricos, Vid y Parral, Hortícolas, Ornamentales y cultivos extensivos.

DOSIS:

CULTIVOS HORTÍCOLAS:

- Tratamientos preventivos: 3-5 L/ Ha.
  - 2 Repeticiones en postrasplante y en momentos de riesgo.
- Tratamientos de choque: 8-10 L/Ha en fertirrigación
  - Repetir cada 7-10 días mientras persistan los síntomas.

CULTIVOS LEÑOSOS:

- Tratamiento general: 4-6 L/Ha.
  - 2 o 3 aplicaciones repartidas durante el todo el ciclo de cultivo.
- Tratamiento de choque: 10 L/Ha.
  - 2 o 3 repeticiones con una separación de 15 días.

CULTIVOS EXTENSIVOS:

- Tratamiento general: 4-6 L/Ha.
  - En inicio de ahijado y/o en hoja bandera.

MORERA BIOCHEM

JOSÉ MORERA S.L.U. pol. 14, parc. 627, Ptda La Venta 46370 CHIVA (VALENCIA) - ESPAÑA
T: +34 963915944
www.morera.com
mail@morera.com

REV ES 0525